

國立成大醫院斗六分院新聞稿

蚊蟲叮咬非小事－淺談恙蟲病

發表日期：103.5.12（星期一）

發表人：感染科/邱鈞瑋醫師

一名 22 歲女性，兩星期前去蘭嶼遊玩，約五天前開始發燒、全身痠痛、無咳嗽流鼻涕現象，至診所求診，但發燒情形未改善。而轉至急診求醫，抽血發現有肝功能異常、血小板降低情形。除此之外，皮膚身上也發現焦痂疹，因此入院治療 2 天後，全身發燒已退，並於隔天出院。

成大斗六分院感染科邱鈞瑋醫師表示，上述個案為恙蟲病感染。症狀會有發燒、全身性痠痛、頭痛，有的病患甚至會有淋巴結腫大情形。另外約有將近一半感染個案會在身上發現無痛性的焦痂，此為感染到恙蟲病很具特色的病徵。抽血檢查可能會有肝功能異常、血小板降低的情形。

邱醫師說，恙蟲病的致病原為立克次體，是不易培養之細菌。此病原體會感染恙蟎，並使恙蟎造成終生感染，而恙蟎多寄生在野生鼠類身上，人類可能會在經過野外時受到恙蟎叮咬，而使得立克次體感染到人身上進而發病，但受到感染的病人並不會將此病傳染給其他人。

古時候居住環境多草叢，容易被恙蟲叮咬，而恙蟲病又是一種急性傳染病，故見面時常相互問候「別來無恙」，這句古人的慣用問候語，道盡了千百年來人類對於恙蟲病的疑懼。在臺灣各縣市均有恙蟲病病例報告，病例主要分布在金門縣、澎湖縣、臺東縣、花蓮縣、高雄市及南投縣。

邱醫師又說，若恙蟲病未經治療，死亡率可達 60%，甚至會併發嚴重肺炎、腦炎、腸胃道出血。但若有適當治療，死亡率低於 5%。邱醫師建議，至郊外時，可穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，以避免被具傳染性的恙蟎附著叮咬；或者於皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑 / 防蚊藥劑，藉以達到預防感染到恙蟲病。

邱鈞瑋醫師資歷：

專科別	現職	經歷
感染科	成大斗六分院主治醫師	成大醫學院附設醫院內科部住院醫師暨總醫師 成功大學醫學院附設醫院內科部感染科研究員

專長
一般內科疾病、感染症

新聞聯絡人：管理中心行政組／林盈君

電話：(05)533-2121分機6203