

植入式人工血管注射座(Port-A)的認識與居家照護

甚麼是植入式人工血管注射座？

人工血管注射座俗稱 Port-A，輸注座銜接導管後，經由皮下植入方式。是一種矽質合成品，可與人體組織同時存在，在臨床使用的安全性以及實用性相當高，可長期且多次注射，避免病人注射藥物時重覆受靜脈穿刺之苦；人工血管注射座之植入需在開刀房進行，可安排住院或門診手術方式執行。

人工血管注射座之適應症

1. 需長期注射化學治療藥物
2. 長期靜脈營養注射
3. 長期輸血或其它需連續且長期性藥物注射



人工血管注射座 (Port-A)的居家照顧

☀、傷口未拆線前：

1. 人工血管手術後傷口多以美容膠覆貼，長度約有 4-5 公分，裝人工血管注射座的位置，皮膚會稍微凸起，因為皮膚上的傷口還未癒合，故要注意傷口的清潔及乾燥，以預防傷口感染，請依照醫護人員衛教方式進行傷口照護。
2. 若傷口有紅、腫、熱、痛、發燒或分泌物等情況，需立即返院求治。
3. 手術後 7-10 天記得依醫師預約時間返院評估傷口或拆線。



☀、注意事項：

1. 化學治療期間，每次化療後Port-A彎針拔除前，護理師會使用抗凝血劑替您沖洗人工血管注射座。
2. 化學療程結束後每次回診時，請醫師開立沖洗人工血管注射座批價單，



國立成功大學醫學院附設醫院
關心您

並於批價後攜至門診 5 樓化學治療室執行沖洗。

3. 人工血管注射座須每月以抗凝血劑沖洗注射座(最久建議不可超過 6 週)，以避免阻塞。**※大動脈植入者須每個星期沖洗一次。**
4. 人工血管注射座沖洗後，若覆蓋之紗布於洗澡或流汗潮濕時可拆下以避免感染。
5. 返家後隨時注意人工血管注射座周圍皮膚，若有紅、腫、熱、痛、出血、發燒或分泌物等情形，需立即返院求治。
6. 人工血管注射座傷口癒合後，可從事一般活動皆不受影響（如：洗澡、打太極拳，但不要故意去壓迫 Port-A 凸起的地方）。
7. 因整個基座縫在肌肉，用力或外力易使它脫落，所以 Port-A 同側手臂應避免用力（如提重物勿超過 10 公斤）和快速 360° 旋轉。
8. 若有頸部或手臂若出現腫脹情形，需立即返院求治。
9. 女性病友若有人工血管注射座凸起，覺得穿內衣感到不方便、會摩擦或不適時，建議可穿著單邊肩帶的內衣(下圖)或無肩帶內衣，減少不適。



※上述款式僅供參考，病友可視個人情況進行調整、訂做或以一般內衣修改

10. 若您對於居家照護仍有疑問，可打電話到您接受治療的病房詢問，
電話：06-2353535 轉_____。



國立成功大學醫學院附設醫院
關心您



製作單位：11B
製作日期：96.11
修訂日期：112.10

07-1-002